

Novità fungicida per vite e orticole



RidomilGold[®]
480SL

**La strategia per mettere
la peronospora in scacco**



RIDOMIL GOLD 480 SL
entra in gioco flessibile ed efficace
nei tuoi programmi di difesa

syngenta[®]



RidomilGold®

480SL

Per la peronospora, non c'è partita!

RIDOMIL GOLD 480 SL, Il nuovo formulato a base di Metalaxil-M, non nasce per lavorare da solo: si tratta, al contrario, di un moltiplicatore di efficacia. Creato per rafforzare il programma di difesa contro la peronospora, si abbina di volta in volta al partner più adatto - prodotti di contatto o ad azione translaminare - a seconda delle diverse fasi fenologiche della coltura.

L'elevata **EFFICACIA** contro le peronospre (Oomiceti) è il risultato di caratteristiche uniche che rendono RIDOMIL GOLD 480 SL un prodotto **MODERNO** nella protezione delle colture.



L'ECCEZIONALE VERSATILITÀ ne garantisce la massima **FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO** consentendo la scelta del partner di copertura più appropriato per ogni fase fenologica della vite.

Grazie alla sua **SPICCATATA SISTEMIA** e la sua traslocazione acropeta, il prodotto viene assorbito e diffuso rapidamente all'interno dei tessuti vegetali, assicurando una **PROTEZIONE COMPLETA** della coltura.

PRINCIPIO ATTIVO	SOLUBILITÀ IN ACQUA A 20°C (mg/lt)	COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE OTTANOLO/ACQUA a PH 7 – 20° C (log P)
Metalaxil-M	26.000	1,71
Metalaxil	8.400	1,75
Benalaxil-M	33	3,68
Cimoxanil	780	0,67



VANTAGGI



FLESSIBILITÀ unica tra gli antiperonosporici



PROTEZIONE duratura della nuova vegetazione in crescita



IMMUNE al dilavamento dopo 1h dal trattamento



SELETTIVO per gli insetti utili



NON IMBRATTA la vegetazione



NESSUNA INTERFERENZA con i processi di vinificazione



RESIDUO IN LINEA con le richieste di mercato
(& Import Tolerance)



ALTA SISTEMIA: RIDOMIL GOLD 480 SL è presente
in tutta la foglia entro 1 ora dal trattamento

PROFILO D'ECCELLENZA

RIDOMIL GOLD 480 SL rispetta pienamente la qualità della produzione alla raccolta e in cantina: non interferisce con i processi di vinificazione preservando inalterata l'attività dei lieviti durante la fermentazione e mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche e sensoriali del vino.

RIDOMIL GOLD 480 SL è destinato esclusivamente per uso fogliare e rigorosamente in miscela con partner (di copertura) a differente meccanismo d'azione, così come previsto dal FRAC e come riportato in etichetta.



RidomilGold[®]
480SL

syngenta[®]

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	DOSI (ml/hl)	DOSI (l/ha)	VOLUMI DI ACQUA (l/ha)	MODALITÀ DI APPLICAZIONE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite (da vino e da tavola)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	20 ml/hl	0,2 l/ha	-	Massimo 2 applicazioni ad intervallo di 7-10 giorni da inizio germogliamento	20 gg
Arancio mandarino clementino lime pompelmo	Allupatura (<i>Phytophthora sp.</i>)	14 ml/hl	0,2 l/ha	-	Massimo 1 applicazione/anno dalla fase di allegagione	14 gg
Patata (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	-	0,2 l/ha	300-600	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni da inizio germogliamento	14 gg
Cipolla (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dalla quinta foglia alla raccolta	14 gg
Broccolo Cavolfiore Cavolo cappuccio Cavolo verza (in campo)	Peronospora (<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dallo stadio di prima foglia vera	20 gg 20 gg 30 gg 30 gg
Cetriolo (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 1 applicazione/anno a partire dallo stadio di terza foglia	3 gg
Cetriolo (in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni a partire dallo stadio di terza foglia	14 gg
Melone Cocomero (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni a partire dal primo germoglio visibile	3 gg
Lattughe e insalate Spinaci e simili Erbe fresche (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dallo stadio di prima foglia vera	10 gg
Pomodoro (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i> .)	-	0,2 l/ha	300-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni dallo stadio di quinta foglia	3 gg
Pomodoro (in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i> .)	20 ml/hl	0,2 l/ha	-	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni dallo stadio di quinta foglia	3 gg

NB: Nessuna "buffer zone" prevista

POSIZIONAMENTO TECNICO


VITE

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni fiorali separati	Fioritura	Acino pepe	Ingrossamento acini	Pre-chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Invaiaatura
 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER					 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER		 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER		

POMODORO DA INDUSTRIA

						
Pre-Trapianto	Trapianto	Sviluppo vegetativo	Fioritura	Ingrossamento bacche	Maturazione	Raccolta
 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER						

PATATA

							
Pre-Semina	Semina	Rincalzatura	Sviluppo vegetativo	Fioritura	Ingrossamento tuberi	Inizio disseccamento	Raccolta
 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER							

LATTUGA

			
Vivaio	Trapianto	Sviluppo vegetativo	Raccolta
 RidomilGold[®] 480SL + PARTNER			



RidomilGold®

480 SL

COMPOSIZIONE

Metalaxyl-M puro g 44 (465,2 g/l)

FORMULAZIONE

Soluzione liquida

COLTURE

Vite (da vino e da tavola), arancio, mandarino, clementino, lime, pompelmo, patata (in campo), cipolla (in campo), broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza (in campo), cetriolo (in campo e serra), melone e cocomero (in campo e in serra), lattughe e insalate, spinaci e simili, erbe fresche (in campo e in serra), pomodoro (in campo e in serra)

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO

RIDOMIL GOLD 480 SL deve essere applicato preventivamente e sempre in miscela con fungicidi a diverso meccanismo d'azione per il controllo della peronospora e dell'allupatura.

Per una corretta difesa fungicida, si raccomanda sempre di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeno.

CONFEZIONI - IMBALLI

Flaconi da 500 ml in cartoni da 20 pezzi

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

n. 18800 del 4 febbraio 2026



syngenta®

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it

