PIRANA

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI OIDIO SU VIT
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)- FRAC CODE 11

PIRANA - Registrazione del Ministero della Salute N. 17553 del 30/11/2023

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
PYRACLOSTROBIN puro g 23,6 (= 250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. **H304** Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H315** Provoca irritazione cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H335** Può irritare le vie respiratorie. **H373** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H361d** Sospettato di nuocere al feto. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P260 Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P264** Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P271** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P280** Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. **P301 + P312** IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI. **P304+P340** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P403** Conservare in luogo ben ventilato. **P405** Conservare sotto chiave. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 12th Floor
30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

Distribuito da:
CORTEVA AGRISCIENCE Italia S.r.l., Via dei Comizi Agrari 10, 26100 Cremona, Italia - Tel. 0372 709900

Stabilimenti di produzione:
Spachem S.L. - Pol. Ind. Guadasequies, s/n 46839 Guadasequies (Valencia), Spagna
Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd., 3rd floor, No.45 Xiangyun Road, 225000 Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina
NITROFARM SA, Industrial area Sindos, S.Q.20 BUILD.35, 57022, Thessaloniki, Grecia

Stabilimento di rietichettatura:
Arco logistica S.r.l., Via Monari 5, 44124 Ferrara (FE) e Via Battistella 22, 44124 Ferrara (FE), Italia

Contenuto: 1-3-5-10 L **Partita n.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIRANA è un fungicida di copertura, con attività preventiva. Il suo principio attivo PYRACLOSTROBIN appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il meccanismo di azione.
PIRANA blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.
Grazie all'ampio spettro di azione, PIRANA possiede un'eccellente efficacia contro l'Oidio della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero Massimo di trattamenti
Vite	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.
La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha, ed equivale quindi a 400 g di prodotto per ettaro. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.
Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose più alta (40 ml/hl) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12 giorni).
Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente consecutivi.
Si consiglia di usare PIRANA soprattutto nel periodo critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già essere eseguito con PIRANA.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto alle dosi raccomandate si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 48 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 novembre 2023
e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 1 maggio 2026